

Pavón piquiamarillo

(*Crax daubentoni*)



Introducción:

Los crax es un género de aves conocidas más comúnmente como pavones o hocos. Habitan principalmente en Centroamérica y Sudamérica.

Son relativamente grandes ya que pueden llegar a medir entre 70 y 95 cm y pueden llegar a pesar entre 3 y 5 kg.

Los machos son principalmente negros con unas vistosas crestas y picos coloreados. Las hembras suelen ser pardas con bonitos diseños y tonalidades. Son principalmente diurnas y pasan la mayor parte del tiempo en el suelo.

Existen 7 especies de Crax todas ellas muy fácilmente diferenciables.

- Crax Alberti
- Crax alector
- Crax blumenbachii
- Crax daubentoni
- Crax fasciolata
- Crax globulosa

- Crax rubra

Conservación:

El Pavón piquiamarillo está clasificado como Especie casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de la UICN 2006, y que se enumera en el Apéndice III del CITES en Colombia.

Zoo Koki es colaborador del proyecto “faisanes del mundo” cuya finalidad es clasificar y ordenar las distintas especies y subespecies de faisanes y actualmente también crácidos, así como mantener un control sobre las poblaciones en España.

Igualmente forma parte del *European Studbook* (ESB) del Pavón piquiamarillo (*Crax daubentoni*)



Breve descripción:

Los machos son principalmente negros, al igual que los otros crax, posee un elegante moño que parece peinado al mínimo detalle. Patas fuertes de color gris pizarra. La parte trasera debajo de la cola en blanco puro. La cola es larga con fuertes plumas de color negro rematadas al final en blanco. Llegan a medir hasta 92 cm.

El pico es fuerte, y está decorado con la característica carúncula superior de color amarillo que le da nombre. Los ojos son marrones con el iris negro.



Las hembras muy similar, pero no posee el pico amarillo.



Sistemática:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Galliformes

Familia: Cracidae

Genero: Crax

Especie: Crax daubentoni (Linnaeus, 1758)

Localización y amenazas:

Habitat: Se encuentra en los bosques de galería de Venezuela y Colombia, también en las tierras bajas caducifolias y bosque perennes, especialmente en valles y barrancos cerca de los ríos. Estas grandes aves de bosque también se congregan en los cursos de agua y cerca de lagos durante la estación seca. El pavón piquiamarillo se ha registrado en estribaciones de hasta 800 m sobre el nivel del mar en Venezuela y de 500 a 1500 m en Colombia.

Amenazas: El hábitat del pavón piquiamarillo se está convirtiendo en una zona amenazada, y por ello las poblaciones están disminuyendo de forma progresiva. La expansión agrícola ha fragmentado los bosques dejando grandes llanos que ya han sido convertidos en campos de arroz. Sin embargo, una amenaza más grave proviene de la fuerte presión de la caza como alimentación y como deporte, incluso en los parques nacionales y reservas. De hecho, en Venezuela, la abundante fauna de las áreas protegidas es particularmente el blanco de los grupos locales de caza.

Unidad social y reproducción

Este hoco es territorial tiene un sistema de apareamiento polígamo. Procura habitar en zonas con amplios recursos ya que cuando los recursos son abundantes menos tiempo debe ser gastado en la defensa de los territorios y más tiempo puede ser invertido en el apareamiento.

Por lo general viven en pequeños grupos familiares de hasta 15 aves puede producirse durante la estación seca

El nido no lo construye en el suelo, sino que busca zonas altas donde ambos sexos colaboran en la construcción. La puesta está compuesta por 2 huevos y suele suceder En Junio (Venezuela) y Mayo (Colombia). En cautividad suelen hacer varias puestas si se retiran los huevos. El tamaño de los polluelos es relativamente pequeño en relación a otras aves similares



Alimentación

En cautividad pueden ser alimentados con un buen pienso para faisanes, algo de fruta y de vez en cuando algunos insectos (gusanos de la harina...) Ya que no se trata de una especie demasiado exquisita en ese sentido.

En estado salvaje se alimenta principalmente sobre el terreno (por ello necesitan de una instalación relativamente grande donde ellos puedan escarbar aunque puede volar hasta en los árboles si se siente amenazado).

Conclusión

Se trata de una especie considerada rara en cautividad. Es elegante y señorial y por supuesto estamos orgullosos de poder alojarla en nuestras instalaciones.

No se han dado detalles de reproducción del *crax daubentoni* en el centro puesto que aun no hemos tenido éxito de cría, ello es debido a que en la actualidad estamos inmersos en una reforma completa del zoo y por ello están alojados en una instalación temporal a la espera de que su instalación definitiva se termine. No obstante estaremos encantados de ir comunicando novedades en las próximas temporadas y quizá en ese momento pueda escribiros algunas líneas sobre la reproducción de esta extraordinaria especie.

Otros datos

Si posees esta u otra especie de hoco o de faisán, nos gustaría que visitaras www.faisanesdelmundo.es y que dejaras constancia de que eres criador. Ya que estamos elaborando un censo (anónimo) de las poblaciones en cautividad de estas especies. Muchas gracias por tu colaboración.



Iñaki Hernández García

Zoo Koki (Parque zoológico y botánico)
www.zoo-koki.com
info@zoo-koki.com